

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDÉE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars.

C. C. P. Nantes 86-04-02

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

- ANGERS

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

SUPPLEMENT N° 3 AU BULLETIN N° 54 DE MARS 1965

INDRE-et-LOIRE - LOIRE-ATLANTIQUE - MAINE-et-LOIRE -
VENDEE - VIENNE.

P. 13

SUPPLEMENT N° 4 AU BULLETIN N° 54 DE MARS 1965

DEUX-SÈVRES (sauf région de la Gâtine)

P. 14

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Le développement de la végétation exceptionnellement rapide depuis quelques jours a considérablement diminué l'efficacité du dernier traitement. Par ailleurs la maturité des organes de conservation de la maladie a beaucoup augmenté. Enfin, quelques très rares taches peuvent déjà apparaître dans les premiers jours d'Avril, uniquement dans les vergers sur lesquels se trouvent des chancres sur les rameaux. En conséquence, il convient donc d'effectuer un traitement soigné dès réception de cette note.

TAVELURE DU POMMIER - Le développement rapide de la végétation a également diminué l'efficacité du dernier traitement. Sur les variétés à débourrement précoce et développant des feuilles avant le dégagement des boutons floraux, (Belle de Boskoop, Cox etc...) il convient de renouveler immédiatement la protection. Par contre sur les variétés développant actuellement peu ou pas de feuilles (Golden, Reinette Clochard etc..) ce traitement peut être repoussé au début de la semaine du 5 au 11 Avril. Enfin, effectuer un premier traitement sur les variétés à débourrement tardif dont les bourgeons arrivent au stade C 3 - D.

Pour la région de la Gâtine, confirmation de la note précédente. Se préparer à intervenir très prochainement.

Utiliser l'un des produits indiqués dans l'édition spéciale.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Les conditions climatiques sont depuis quelques jours extrêmement favorables à l'Oïdium du pommier et ses germes se forment en abondance. En conséquence il est indispensable, sur les variétés sensibles, d'ajouter un produit anti-oïdium à la bouillie destinée à lutter contre la tavelure.

KYLEBORES - La période actuelle est favorable à l'activité de ces insectes. Dans les vergers où des dégâts ont été constatés au cours des années passées, il convient d'effectuer un traitement à l'aide d'un produit à base d'H. C. H. ou de Zeidane (D. D. T.) à raison de 200 à 300 grs. de matière active par hectolitre. Le Lindane à 30 grs. de matière active par hectolitre peut être également utilisé. L'adjonction d'une huile blanche d'été renforcera l'efficacité de ce traitement qui devra être copieux, et viser la charpente des arbres.

PUCERON VERT DU POMMIER - Les premiers foyers viennent d'être observés ; en conséquence, sur les arbres contaminés en 1964 et présentant de la fumagine sur les rameaux, ajouter à la bouillie destinée à lutter contre la tavelure un produit aphicide.

CACOEZIA DU POIRIER - Dans les vergers très contaminés l'année dernière, un premier traitement à l'aide d'une spécialité à base de parathion ou de diazinon peut être effectué aussitôt avant la floraison.

L'Inspecteur de la Protection des

Végétaux :

- J. DIXMERAS -

Les Contrôleurs chargés des

Avertissements Agricoles :

- R. GEOFFRION - J. BOUCHET -

Tirage du 31 MARS 1965 - 2 600 exemplaires

INDRE-et-LOIRE - LOIRE-ATLANTIQUE - MAINE-et-LOIRE VENDEE...VIENNE..... P 14
DEUX-SEVRES (sauf région de la Gâtine) P 15